

正誤表

『膵・消化管神経内分泌腫瘍（NEN）診療ガイドライン』2019年第2版第1刷（2019年9月25日発行）、第2刷（2019年12月10日発行）に誤りがございました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

2020年6月15日

金原出版株式会社

記

頁	訂正箇所	誤	正
4	アルゴリズム3の表	大量の水様性下痢，低カリウム血症， <u>低クロール血症</u> ，代謝性アシドーシス。また…	大量の水様性下痢，低カリウム血症， <u>無（低）酸症，高クロール血症</u> ，代謝性アシドーシス。また…
32	推奨の上から2行目	大量の水様性下痢と低カリウム血症， <u>低クロール血症</u> ，代謝性アシドーシスなどである。	大量の水様性下痢と低カリウム血症， <u>無（低）酸症，高クロール血症</u> ，代謝性アシドーシスなどである。
32	解説の上から4行目	低カリウム血症や <u>低クロール血症</u> をきたすのに加え，……	低カリウム血症や <u>無（低）酸症</u> をきたすのに加え，……
37	コラムの下から2行目（文献引用箇所の位置）	ソマトスタチンアナログの点滴静注が有用とされてきたが ³⁾ ，無効とする報告もある ^{4,5)} 。	ソマトスタチンアナログの点滴静注が有用とされてきたが，無効とする報告もある ³⁻⁵⁾ 。

以上